

Mediterráneo

Chinotto

FICHA N.º 02

Citrus × aurantium var. myrtifolia **Rutáceas**

Perenne **Exterior con abrigo** **Pleno sol** **Heladas suaves** **Cuidado medio**

Su apellido, *myrtifolia*, se debe a que sus hojas recuerdan a las del mirto. En la costa de Savona, en Liguria, se cultiva desde hace siglos para confitería y refrescos; en 2004 apenas quedaban unas decenas de árboles y Slow Food lo protegió.

Cuidados del chinotto

Citrus × aurantium var. myrtifolia



Lugar	Fuera, al sol y resguardado del viento. Con menos de 2 o 3 horas de sol directo florece poco.
Riego	Cuando la capa superior empiece a secarse, hasta que salga agua por abajo. Vacía el plato.
Abono	De febrero a octubre, con abono para cítricos.
Sustrato	Para bonsái de hoja ancha, que drene bien.
Trasplante	Cada 2 o 3 años, en febrero o marzo, antes de brotar. Aclara algo la copa al hacerlo.
Poda	La de estructura, a finales de invierno. En verano, solo retoques.
Pinzado	Deja que el brote saque 6 a 8 hojas y recórtalo a las 2 primeras.
Alambrado	Todo el año. En primavera engorda rápido: vigila el alambre.
Frío	Aguanta heladas suaves y cortas. Por debajo de unos −3 °C, resguárdalo sin calefacción.

Calendario

Luce: ❀ flor ♁ fruto

	E ♁	F ♁	M ❀	A ❀	M ❀	J	J	A	S	O ♁	N ♁	D ♁
Abono		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Poda		■	■									
Trasplante		■	■									
Pinzado				■	■	■	■	■	■			

Pensado para clima mediterráneo. En zonas frías, retrasa los trabajos de primavera.

Si ves algo raro

Minador: galerías plateadas en las hojas tiernas, que se rizan. Retira las muy dañadas.

Pulgón y cochinilla: colonias en los brotes o bultitos en hojas y ramas, con melaza pegajosa y negrilla. Límpialos pronto.

Clorosis: hojas amarillas con nervios verdes: falta de hierro por la cal.

Ante la duda, consulta antes de tratar.

En el móvil